

Bröstbevarande operation

Bröstbevarande operation är den vanligaste operationsmetoden. Metoden innebär att cancertumören tas bort tillsammans med en marginal med frisk vävnad. Bröstvävnaden som är kvar förs samman för att återställa bröstformen. Efter en bröstbevarande operation får du nästan alltid strålbehandling för att minska risken för återfall.

Om det inte går att känna var i bröstet tumören finns, gör man en markering av tumören med ultraljud eller mammografi så att kirurgen ska veta var tumören finns. Det finns flera olika sätt att markera var tumören finns, till exempel metalltråd, kolmarkering, clips, radioaktiva eller magnetiska korn.

Vårdform: Dagkirurgi eller inneliggande.

Operationstid: 1–2 timmar, inklusive operation i armhålan.

Sjukskrivning: 1–3 veckor beroende på hur du mår och vilket arbete du har.

Du kan behöva ytterligare en operation om marginalerna till den friska vävnaden blir för små. Det händer vid ungefär var tionde operation.

Årr: Det varierar, bland annat beroende på tumörens läge i bröstet.

Övrigt: I enstaka fall läggs ett dränage in under operationen för att leda bort sårvätska de första dagarna.

Bröstbevarande operation med onkoplastikteknik

Om operationen gör att bröstets form ändras mycket, kan man flytta bröstkörtelvävnad för att förändra formen. Ingreppet kallas onkoplastikkirurgi. Ibland opererar man även det andra bröstet för att bröstet ska se lika ut.

Efter operationen

Efter operationen får du ett återbesök. Då får du information om det behövs någon ytterligare operation och du får svar på vävnadsanalyserna, det vill säga vilka egenskaper tumören har.