

Operation av bröstcancer

Det finns två huvudsakliga operationsmetoder vid bröstcancer:

- bröstbevarande operation, där en bit av bröstet tas bort (kallas även partiell mastektomi eller sektorresektion).
- mastektomi, där hela bröstet tas bort

I de flesta fall opereras du även i armhålan för att undersöka om cancer har spridit sig till lymfkörtlarna, så kallad sentinel node biopsi. Efter operationen analyseras tumören och lymfkörtlarna från armhålan för att erbjuda rätt fortsatt behandling.

Vid bröstbevarande operation strålbehandlas nästan alltid bröstet efter operationen. För att styra strålbehandlingen till tumörområdet används små metallclips. Dessa placeras i bröstvävnaden i samband med operationen. Även vid mastektomi kan strålbehandling ibland rekommenderas.

Alla operationsmetoder passar inte för alla kvinnor. Du och din kirurg kommer överens om vilken metod som är bäst för dig. Flera faktorer påverkar vilken metod du rekommenderas:

- Tumörens storlek i förhållande till bröstets storlek
- Hur tumören växer
- Hur många tumörer som finns i bröstet
- Var i bröstet tumören sitter
- Om du kan strålbehandlas
- Dina önskemål

Bröstet kan ändra utseende och form efter operationen. Om du ska operera bort hela bröstet behöver du diskutera med läkaren om du vill ha en bröstrekonstruktion direkt i samband med operationen, senare eller inte alls.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Operation vid bröstcancer.