

Behandling av tjocktarmscancer

Vid tjocktarmscancer är operation den huvudsakliga behandlingen. Operationen kombineras ibland med cytostatika. Vid tjocktarmscancer får du nästan aldrig strålbehandling.

Operation

Vid operation av tjocktarmscancer opererar man bort den del av tarmen där tumören sitter. Den kvarvarande tarmen kopplas därefter ihop igen. Det är ovanligt med stomi vid operation av tjocktarmscancer.

Cytostatika

I vissa fall av tarmcancer är det aktuellt med behandling med cytostatika. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga vid behandling av cancer. Om du redan från början har en spridd eller avancerad cancersjukdom börjar man ibland med cytostatikabehandling. Cytostatika ges för att krympa tumören och därmed förbättra förutsättningarna för att senare kunna operera bort den.

När man har opererat bort tumören undersöks den borttagna tarmdelen i mikroskop. Om man då ser att tumören växer på ett sätt som ger ökad risk att tumören kan sprida sig, kan behandling med cytostatika bli aktuell efter operationen. Cytostatika ges då för att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka.

Om tumören inte går att operera bort kan cytostatika ges som enda behandling för att lindra symtom och bromsa tillväxten av cancercellerna.

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tablett. Vanligtvis får du cytostatika några dagar i följd och sedan görs ett uppehåll på några veckor innan du börjar en ny behandling.