

# Behandling av ändtarmscancer

De typer av behandling som kan bli aktuella vid ändtarmscancer är operation, strålbehandling och/eller cytostatika.

## Operation

Vid operation av ändtarmscancer opererar man oftast endast bort den del av tarmen där tumören sitter. Därefter görs ofta en koppling mellan tjocktarmen och ändtarmsöppningen. Du får då oftast en tillfällig stomi medan denna koppling läker. Stomi är en tarmöppning på magen där avföringen leds ut till en påse. I vissa fall sitter tumören så nära ändtarmsöppningen att hela ändtarmen och ändtarmsöppningen måste opereras bort. Du får då en permanent stomi.

► Du får mer information om Stomi om det är aktuellt för dig.

## Strålbehandling

Vid ändtarmscancer är det vanligt att du får strålbehandling mot tumören innan operation. Strålbehandling används för att få tumören att krympa och för att förebygga återfall. Strålningen ges mot ett begränsat område på kroppen, precis där cancertumören finns.

Strålbehandlingen anpassas efter tumörens sätt att växa och hur avancerad den är.

## Cytostatika

I vissa fall av tarmcancer är det aktuellt med behandling med cytostatika. Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga vid behandling av cancer. Om du redan från början har en spridd eller avancerad cancersjukdom börjar man ibland med cytostatikabehandling. Cytostatika ges för att krympa tumören och därmed förbättra förutsättningarna för att senare kunna operera bort den.

När man har opererat bort tumören undersöks den borttagna tarmdelen i mikroskop. Om man då ser att tumören växer på ett sätt som ger ökad risk att tumören kan sprida sig, kan behandling med cytostatika bli aktuell efter operationen. Cytostatika ges då för att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka.

Om tumören inte går att operera bort kan cytostatika ges som enda behandling för att lindra symtom och bromsa tillväxten av cancercellerna.

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tabletter. Vanligtvis får du cytostatika några dagar i följd och sedan görs ett uppehåll på några veckor innan du börjar en ny behandling.