

Ryggbedövning

Ryggbedövning kan användas för att antingen smärtlindra, eller för att helt bedöva, underkroppen. I bägge fallen sprutar läkaren in bedövande läkemedel in i ryggen. Det finns två metoder för ryggbedövning: epiduralbedövning och spinalbedövning. Det som skiljer metoderna åt är hur långt in i ryggraden bedövningsmedlet sprutas.

När du ska få ryggbedövning

Ibland ges ryggbedövningen medan du sitter, ibland får du ligga ner.

Du kan få lokalbedövning i huden, innan du får själva ryggbedövningen. Behandlingen tar vanligtvis 5 till 10 minuter och det kan ta upp till 30 minuter innan den når full effekt.

Biverkningar och komplikationer

- Blodtrycket kan sjunka när bedövningen verkar, därför kontrolleras det regelbundet.
- Du kan vara öm i ryggen, ha klåda i huden och få ett blåmärke vid instickstället. Det går vanligen över av sig själv inom några dagar.
- Om du varit helt bedövad av ryggbedövningen är det vanligt att skaka och huttra efter operationen. Det brukar gå över efter några timmar. Det kan även vara svårt att kissa efter en ryggbedövning, kontakta i sådana fall vården.
- Du kan få huvudvärk efter en ryggbedövning. Då är det bra att dricka mycket och ta värktabletter. Om det inte går över efter ett till tre dygn kan du få annan behandling.
- Allvarliga och bestående nervskador efter en ryggbedövning är mycket ovanligt.