


## Subkutan venport (SVP)

Om du ska få läkemedel via dropp kommer du troligen att behöva en central infart till ditt blodomlopp. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och blodprover kan tas från den.

En subkutan venport, SVP, är en central infart, en liten dosa som opereras in under huden, vanligast på bröstkorgen. Dosa är cirka två till tre centimeter i diameter. En SVP kan användas under en lång period, från några månader till flera år.



### Förberedelser

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig inför operationen.

### Så går det till

Du får lokalbedövning före operationen. Det betyder att du är vaken under operationen men du blir bedövad i de områden där venporten opereras in. Dosa opereras in under huden på bröstkorgen. Katetern läggs oftast in i något av de större blodkärlen.

### Efteråt

Bedövningen släpper efter cirka tre till fyra timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Du kan ta smärtstillande läkemedel. Du får mer information om det före operationen.

Förbandet och eventuella stygn tas bort efter drygt en vecka. Du får hjälp med det av en sjuksköterska där du får behandling eller på en vårdcentral eller i hemsjukvården. Du kan duscha som vanligt tills förbandet tas bort. Bada inte innan operationssåret är läkt och inte när du har en nål i venporten.

Du får ett kort med dosans nummer och operationsdatum. Ha alltid med dig det kortet.

### Att ha en venport

Venporten kan användas så fort den är inopererad.

När såret har läkt behövs inget förband och du kan bada, simma och bada bastu om inte en nål är insatt i dosan.

När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Nålen kan sitta i fem till sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts nålen eller tas bort. Tycker du att det är obehagligt att få ett stick kan du be att få salva/plåster med lokalbedövning på huden.

Varje gång sjuksköterskan kopplar på eller kopplar ifrån ett dropp eller tar ett blodprov, kommer du få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den används.

När venporten inte används behöver den inte skötas om på något särskilt sätt.

### När tas den bort?

En venport kan sitta kvar och användas i flera år. Du och din läkare bestämmer tillsammans hur länge venporten ska sitta kvar. Den tas bort genom en liknande operation som när den sattes in.

### Tips

Om du åker bil kan bilbältet skava där venporten har opererats in. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet. Skydda ärret mot solstrålar det första året.

### När ska jag kontakta vården?

- Vid infektionssymtom som feber eller frossa eller svullnad vid operationsområdet.
- Vid blödning från operationssåret eller från platsen för dosan.
- Vid smärta eller tyngdkänsla i armen på samma sida av kroppen som dosan sitter.