


## Central venkateter (CVK)

Om du ska få läkemedel via dropp kommer du troligen att behöva en central infart till ditt blodomlopp. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och blodprover kan tas från den.

En central venkateter, en så kallad CVK, är en mjuk, tunn slang som läggs in i ett blodkärl under en operation.



### Förberedelser

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig för operationen.

### Så går det till

Via ett hudstick förs slangen in i kärlet. Innan sticket får du lokalbedövning i huden vilket kan svida och sticka under kort stund. Vid behov kan du även få lugnande och smärtstillande medicin i samband med inläggningen av CVK:n. När huden är bedövad gör det inte ont med inläggningen, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området. Bedövning och inläggning av CVK tar totalt oftast mindre än en timme.

### Efteråt

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras din puls, andning och ditt blodtryck regelbundet. Bedövningen släpper efter cirka tre till fyra timmar. Då

kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Om du har ont kan du få smärtlindring.

Ditt operationssår kontrolleras också eftersom det kan uppstå en blödning där de första timmarna efter operationen. Innan du kommer till avdelningen eller går hem får du göra en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag. Efter operationen kan du äta och dricka som vanligt. De första dagarna efter operationen kan du känna ett visst obehag från CVK:n men det brukar försvinna.

### **Att ha en CVK**

Förbandet vid CVK:n ska bytas en eller två gånger per vecka. Du får hjälp av en distriktssköterska eller sjuksköterska från sjukhuset.

Det är bra om du regelbundet tittar på din CVK:n och huden runt omkring och är observant på eventuella infektionstecken som till exempel rodnad hud. Du kan duscha som vanligt med en CVK om den är täckt med förband, men du ska inte bada.

Varje gång sjuksköterskan kopplar eller kopplar ifrån ett dropp eller tar ett blodprov kommer du få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar som den ska innan den används.

### **När ska jag kontakta vården?**

- Vid infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid operationsområdet.
- Vid blödning från operationssåret eller från platsen för CVK:n.