

Perifer venkateter (PVK)

För att kunna få läkemedel direkt i blodet eller inför vissa undersökningar kan det bli aktuellt med en perifer venkateter, PVK. En PVK är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl med hjälp av en nål.

Förberedelser

Den tunna katetern förs in i blodkärllet via ett stick genom huden. Om du tycker att det är obehagligt med stick kan du få lokalbedövning, i form av kräm eller plåster. Det går att köpa bedövningskräm eller bedövningsplåster receptfritt på apotek.

Bedövningen verkar enbart där krämen eller plåstret sitter. Därför är det viktigt att placera bedövningen där det finns synliga blodkärl. Sätt gärna bedövning på minst två olika ställen. Känner du dig osäker prata med apotekspersonalen eller personalen på mottagningen där du ska få venkatetern.

Så går det till

Det är oftast en sjuksköterska som sätter venkatetern. Ett band sätts ofta runt armen en kort stund, och dras åt, för att blodkärlen ska fyllas upp och bli tydligare. Sjuksköterskan tvättar huden vid lämpligt blodkärl, för in venkatetern och drar ut nålen. Venkatetern hålls på plats av ett genomskinligt förband.

Det kan kännas lite efter att venkatetern är satt, men det går över efter en stund. Kontakta din läkare eller kontaktsjuksköterska om du blir öm, röd eller svullen runt venkatetern.

Venkatetern kan användas fler gånger utan att du behöver få upprepade stick. Hur länge samma venkateter kan användas beror på vad den används till och om den fungerar bra.

Venkatetern tas bort av en sjuksköterska som lossar förbandet och drar ut katetern. Du får en kompress över insticksstället. Att få en venkateter borttagen brukar inte göra ont och tar bara någon minut.