

Hud och slemhinnor- vid cytostatikabehandling

Besvär med hud och slemhinnor är vanliga biverkningar vid cytostatikabehandling. Alla får inte besvär och det finns både läkemedel och andra sätt att lindra.

Huden blir ofta torrare och mindre elastisk och det kan ta längre tid för sår att läka. Huden blir även mer känslig för sol under behandlingen och cirka ett år efter, till exempel finns en ökad risk för pigmentförändringar. Om du tar kortison under din cancerbehandling blir huden tunnare. Blodådrorna kan också bli tydligare genom huden under behandling med kortison. Det är inte farligt.

Slemhinnorna i kroppen är känsliga för cytostatika och blir ofta torra under en behandling. Det beror på att slemhinnornas celler inte hinner nybilda sig tillräckligt snabbt under en behandling. Slemhinnor finns bland annat i munnen, matsmältningskanalen, ögonen, urinvägar och underlivet. Besvär som muntorrhet, torra ögon, illamående, diarré och ändtarmsbesvär är vanliga. Slemhinnorna i underlivet kan bli sköra och lättblödande och det kan göra ont vid samlag. Urinvägarnas slemhinna kan också påverkas och du kan få ett ökat behov av att kissa. Det kan göra ont att kissa och ibland kommer det blod i urinen.

Egenvårdsråd av hud och slemhinnor

Hud

- Smörj huden regelbundet med mjukgörande hudkräm.
- Skydda huden mot solen. Använd solskyddsfaktor, heltäckande kläder och hatt.
- Smörj de områden som inte täcks av kläder med solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.
- Sitt om möjligt i skuggan när solen är som starkast.
- Använd rakapparat i stället för hyvel för att undvika skärsår.

Mun

- Skölj munnen med kolsyrat vatten eller koksaltlösning.
- Borsta tänderna med en mjuk tandborste.
- Använd salivstimulerande sugtablett, gel eller spray som kan köpas på apotek.

Ögon

Använd ögondroppar om du har torra ögon. De kan köpas på apotek.

Underlivet

Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du är torr i slidan.

Urinvägar

Om du har besvär med urinvägarna kan det hjälpa att dricka rikligt, upp till 1,5 liter/dygn. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du har besvär med urinvägarna.

