Akut myeloisk leukemi (AML)

Akut myeloisk leukemi (AML), också kallad akut myeloblast eller myeloid leukemi, är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Diagnosen baseras på fyndet av onormala celler i blodet och benmärgen med en samtidig minskning av antalet normala röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter).

Det är viktigt att behandling inleds omgående efter det att diagnosen fastställts. De främsta symtomen vid insjuknande är trötthet, lätt sjukdomskänsla och allmänsymtom. Dessa symtom kan dock vara både måttliga och ospecifika, vilket försvårar att en diagnos fastställs. En påtaglig blodbrist (anemi) är å andra sidan vanligt förekommande hos dem som drabbats av AML.

I Sverige drabbas runt 350 personer av AML årligen och risken att drabbas ökar hos individer över 40 år. Även om könsfördelningen är jämn, så insjuknar fler äldre män än kvinnor av sjukdomen.

I likhet med andra leukemiformer är orsakerna till AML i majoriteten av fallen okända. Personer som genomgått strålbehandling eller cytostatikabehandling kan drabbas av en så kallad sekundär leukemi, vilket beror på dessa behandlingars påverkan på celler under bildning och utveckling i benmärgen. I de flesta fall går det dock inte att hitta någon utlösande orsak till AML.

► Läs mer om AML på Blodcancerförbundet.se

► Läs mer om leukemi på 1177.se.