Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

En perifert inlagd central venkateter, PICC-line, är en tunn slang som läggs in i ett blodkärl i överarmen. En bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få läkemedel, blod, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från den.

En PICC-line kan användas under lång tid, upp till flera månader.



PICC-line.

Hur ska jag förbereda mig?

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig.

Oftast kan du ta läkemedel och äta som vanligt.

Så går det till

Du får ett första nålstick genom huden, det känns ungefär som att ta blodprov Innan slangen förs in i ett blodkärl i överarmen får du lokalbedövning. Ingreppet görs av en sjuksköterska med ultraljud som stöd.

Ingreppet tar mindre än en timme.

Ibland görs en röntgen efteråt för att kontrollera att din PICC-line ligger rätt och kan användas.

Hur mår jag efteråt?

Det kan blöda lite från stickstället första dygnet. Du behöver ett nytt förband om det blöder mycket. Kontakta då en vårdcentral, hemsjukvården eller den som lagt in din PICC-line.

En gång i veckan behöver förbandet bytas och venkatetern spolas. Det görs antingen i samband med en behandling, på vårdcentralen eller av hemsjukvården.

Du kan använda armen som vanligt, vara fysiskt aktiv och träna som du brukar. Men undvik monotona och långvariga rörelser med armarna ovanför huvudet.



PICC-line i armen.

Du kan duscha som vanligt, men undvik att bada och basta. När du duschar behöver du skydda förbandet så att det inte lossnar från huden. Om förbandet lossnar ökar risken för infektion. Duschskydd finns att köpa på apotek eller på nätet.

När ska jag kontakta vården?

- Om du har symtom på infektion, som feber, frossa, svullnad eller rodnad vid stickstället.
- Om det blöder från stickstället.
- Om armen som PICC-linen sitter i gör ont, svullnar eller känns tung.

Läs mer på 1177.se. Sök på PICC-line.