

SVP – en dosa med slang under huden

En SVP är en liten dosa med en tunn slang som opereras in under huden, oftast på bröstkorgen. I den kan du få medicin, blod, vätska och näring. Du kan även lämna blodprover från den.

En SVP gör att du kan få behandling och lämna prover ofta, utan att vårdpersonalen behöver sticka dig varje gång.

SVP betyder subkutan venport.

Du kan ha den i flera år om det behövs. Du och din läkare bestämmer tillsammans hur länge du ska ha den.

När den tas bort görs det vid en liknande operation som när den sattes in.

Hur ska jag förbereda mig?

Vårdpersonalen berättar hur du ska förbereda dig.

Så går det till

Venporten sätts in när du ligger på sjukhuset. Du är sövd när venporten sätts in. En närstående person får vara med tills du somnar.

En kirurg sätter in venporten. Du får ett förband, alltså ett stort plåster.

Operationen tar oftast mindre än en timme.

Hur mår jag efteråt?

Du stannar en stund på en avdelning där du får vakna upp. Såret kontrolleras, eftersom det kan börja blöda där de första timmarna.

Det kan göra ont runt venporten, framför allt det första dygnet. Vissa tycker att det känns obehagligt att vrida på huvudet. Om du har ont kan du få medicin.

Ibland görs en röntgen för att kontrollera att slangen ligger rätt.

Du kan äta och dricka som vanligt.

De första dagarna kan det kännas lite obehagligt vid venporten, men det brukar försvinna.


Förbandet tas bort efter drygt en vecka. Om du har fått stygn tas de också bort då.

Att ha en venport

Du får en nål i venporten när den ska användas

När venporten ska användas sätter en sjuksköterska en nål i dosan. 1–2 timmar innan sätter du på bedövningskräm eller bedövningsplåster.

Dosan har en botten av metall. Det gör att man inte kan sticka rakt igenom den.



Du får en nål i venporten när den ska användas.



Venporten sitter oftast på bröstkorgen.

3. BEHANDLING Infart

Sjuksköterskan kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den används.

Nålen byts regelbundet. Hur ofta får du veta av vårdpersonalen. Nålen tas bort när den inte längre behövs.

Fäst slangen när du ska röra på dig

När du rör på dig mycket och nålen sitter i, fäst slangen med en extra bit tejp på huden och kläderna.

Dusch och bad går bra när du inte har en nål i venporten

När du inte har en nål i venporten behöver den inte skötas om på något särskilt sätt. Du kan duscha och bada som vanligt.

När du har en nål i venporten ska du inte bada eller basta.

Innan såret är läkt ska du heller inte bada eller basta.

Bilbältet kan skava

Om du åker bil kan bältet skava där venporten sitter. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.

Skydda ärret mot sol

Skydda ärret mot solen det första året.

Om du får åka hem med en nål i venporten – var försiktig

Ibland får du åka hem från sjukhuset med en nål kvar i dosan. Det kan vara om du snart ska tillbaka till sjukhuset för att få behandling eller lämna blodprover. Då måste du vara försiktig så att nålen inte åker ut eller slangen går av. Klämman som sitter på slangen ska alltid vara stängd. Du får absolut inte leka med slangen genom att ge dig själv en spruta, vrida på kranen eller ta bort korkar som sitter på slangen.

Om slangen går av eller kranarna lossnar, lägg dig ner och dra ut nålen. Ta bort förbandet, håll i plattan under nålen med ena handen och dra nålen rakt upp med den andra handen. Det kan kännas lite trögt, eftersom nålen sitter i silikon. Sätt ett plåster där nålen har suttit. Kontakta sedan vården.

Om nålen åker ut, ta bort förbandet. Annars kan nålen ligga under förbandet och skava mot huden. Kontakta sedan vården.

När ska jag kontakta vården?

- Om slangen går av eller lossnar.
- Om nålen åker ut.
- Om du har tecken på infektion, som feber eller att det är svullet och rött vid venporten.
- Om det blöder från såret eller där venporten sitter.
- Om det gör ont eller känns tungt i armen på den sida där venporten sitter.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Subkutan venport.