

Kronisk Myeloisk Leukemi
Utsättning av TKI

Personnummer

-

Patientnamn

Gäller fr o m 180101

Inrapporterande sjukhus, klinik

Inrapporteringsdatum

(ååmmdd)

Uppgifter kopplade till TKI-stopp (mer än 4 veckor)
hos patienter med KML

Rapporterande läkare

Namnteckning

Har behandlingen med TKI¹ varit utsatt (mer än 1 månad) vid något tillfälle sedan start av TKI-behandling?

Nej Ja

Om man svarar NEJ släcks resten av blanketten

Om Ja, vilken TKI behandling stod patienten på vid stopp Imatinib Dasatinib Nilotinib Bosutinib Ponatinib

Datum för första utsättande av TKI (ååmmdd) _____

Huvudsaklig orsak till utsättandet?

(flera alternativ kan markeras)

- Mycket bra terapivar, dvs "djup molekyllär respons" (i regel MR4 eller bättre)
 Inför allogen stamcellstransplantation
 Biverkan / bristande TKI-tolerabilitet
 Dålig följsamhet
 Patientens egen önskan
 Graviditet / planerad graviditet
 Annat _____

Gjordes stoppet inom ramen för en klinisk studie Nej Ja

Har TKI återinsatts Nej Ja

Om man svarar Nej släcks resten av blanketten

Om Ja, vilken TKI återinsattes Imatinib Dasatinib Nilotinib Bosutinib Ponatinib

Datum för återinsättande av TKI (ååmmdd) _____

Orsak till återinsättande: Förlorad MMR² Annan orsak: _____

2018-02-21 KO

¹TKI med godkänd indikation för behandling av KML: imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib.