

Temozolomid (3-dagars) +Rituximab

Rituximab	375 mg/m ² (avrunda till närmsta 100-tal uppåt)	iv inf 2-4 tim	Dag 1 (KUR 1)
Rituximab	1400 mg standarddos	sc inj 5 min	Dag 1 (KUR 2 och följande)
Temozolomid	300 mg/m ²	po kapsel	Dag 1-3

Före kur; Blodstatus, neutro.

Behandling under 1 år.
Cykelintervall 14 dagar.

OBS! Om kräkning uppträder efter att dosen Temodal givits skall inte en andra dos ges den dagen. Temodal sväljs hela tillsammans med lite vatten. Kapslar får ej öppnas eller tuggas.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Dosreduktion för Temozolomid:

LPK (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	
≥1,5x10 ⁹ /L	≥100x10 ⁹ /L	100%
≥1.0-1,5	≥75- 100	75%
<1.0	< 75	Beh uppskjutes 7 dagar

Ingen dosreduktion för Rituximab.

Riktlinjer hur man ger rituximab

Första infusion:

Starta med 50 mg/h. Därefter ökning med 50 mg/h var 30:onde minut till max 400 mg/h.

Tavegyl ges profylaktiskt alltid vid första infusionen.

BT/puls vid start och därefter vid symtom.

Om läkemedelsreaktion - stoppa droppet tills reaktionen klingat av. Vid återupptagning av behandling välj den dropphastighet som pågick vid start av reaktion.

Följande behandlingar (om första behandlingen var utan allvarliga infusionsreaktioner):

1400 mg sc inj (fast dos) som ges under 5 min.

Tavegyl ges inte som rutin.