Datum: _____ Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Caelyx

(Bröstca.)

Inf Caelyx	40 mg/m^2 ges till patienter som tidigare fått mycket behandling och äldre. 50 mg/m^2 ges till patienter som är relativt obehandlade och yngre.	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Bilirubin.
OBS! Lever och hjärtfunktion.
För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 med Caelyx ges enligt följande: Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion med ordinarie hastighet.
Cykelintervall: 28 dagar.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Behandling vid en allergisk reaktion orsakat av Caelyx – se lokala instruktioner!

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Po. tas 1 tim före behandling

T/Inj Ondansetron 8 mg po/iv _____ _____

T/Inj Betapred 8 mg po/iv _____ _____

OBS! *Spoldropp endast Glucos.*

Inf Caelyx _____mg iv i 250 ml Glucos 50 mg/ml. Inf.tid 1 tim _____ _____

Start _____
Stopp _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____