

## Trastuzumab sc/Docetaxel (Bröstca)

<b>Trastuzumab (Herceptin)</b>	600 mg/ 5 ml	sc inj 2-5 min	Dag 1
<b>Docetaxel*</b>	75- 100 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>G-CSF**</b>	300 µg/30 ME till patienter <70 kg 480 µg/48 ME till patienter >70 kg	sc inj	Dag 4 -11

\*\*Vid lågdos Docetaxel, G-CSF ges vid efterföljande kurer om problem med neutropeni /neutropen feber.

Endast inför kur 1: ASAT, ALAT, Bilirubin.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Mellanprov: Ta blodstatus dag 9 (nadir).

Före kur: Kortisonschema vid behandling med lågdos/högdos Docetaxel

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT. Läkare ska finnas tillgänglig de första 10 min av infusionstiden.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

LVEF mätning med hjärtscint eller U-ljud var tredje månad.

OBS! Leverfunktion!

\*Om över 185 mg Docetaxel så ska det blandas i 500 ml NaCl istället för 250 ml.

Ingen dosreduktion för Trastuzumab.

### Dosreduktion:

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-Neutrofiler (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Docetaxel</b>
<2,5	<1,0	Beh. Skjutes upp tills dessa värden uppnåtts

Om kuren skjuts upp 2 veckor eller mer – reducera docetaxeldosen till 75%.