

**Docetaxel (Taxotere) Lågdos (bröstca)**

<b>Docetaxel</b>	75- 80 mg/m <sup>2</sup>	iv inf 1 tim	Dag 1
------------------	--------------------------	--------------	-------

\*G-CSF ges dag 4-11 vid efterföljande kurer om problem med neutropeni /neutropen feber.

<b>*G-CSF</b>	300 µg/30 ME till patienter < 70 kg 480 µg/48 ME till patienter > 70 kg	sc inj	Dag 4 -11
---------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------

Endast inför kur 1: ASAT, ALAT, Bilirubin.

Inför varje kur: Blodstatus, neutr.

Mellanprov: Blodstatus dag 9 (nadir).

Efter kur: Kortisonschema för lågdos Docetaxel.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall var sjätte till nionde vecka.

Docetaxel/FEC kurer kan ges sekventiellt.

OBS! Leverfunktion!

**Dosreduktion:**

<b>B-LPK (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>B-Neutrofiler (x10<sup>9</sup>/L)</b>	<b>Docetaxel</b>
< 2,5	< 1,0	Beh. Skjutes upp tills dessa värden uppnåtts