

## Operation i armhålan

I de flesta fall opereras du även i armhålan, för att undersöka om cancer har spridit sig till lymfkörtlarna. Oftast görs operationen samtidigt som ditt bröst opereras. Om du har metastaser, det vill säga dottertumörer, avgör det vilken efterbehandling du rekommenderas. Det vanligaste är att cancer inte har spridit sig till lymfkörtlarna.

Oftast undersöks den första lymfkörteln, den så kallade portvaktskörteln. Portvaktskörteln heter på engelska "sentinel node", och därför kallas denna undersökning ofta sentinel node-biopsi. Om cancer har spridit sig kan du behöva operera bort flera lymfkörtlar. Det kallas för axillutrymning.

Före operationen sprutas ett ämne in under huden intill brösttumören eller i kanten av vårtgården. De vanligaste är radioaktiv isotop, magnetisk järnoxid eller blåfärg. De kan användas var för sig eller i kombination med varandra. Syftet är att hitta portvaktskörtlarna (1–3 stycken). Den blå färgen färgar urinen och ibland avföringen blågrön 1–2 dygn efter operationen. På bröstet kan det bli en blå eller brun fläck som bleknar bort så småningom.

Efter operationen undersöker man portvaktskörteln. Ibland upptäcks då att cancer har spridit sig. Det kan innebära att du måste opereras igen för att ta ut fler lymfkörtlar.

### Dränage

Om flera lymfkörtlar måste tas bort kan du ibland behöva ett dränage i såret. Det är en slang med en påse som sitter utanför kroppen, och som gör att sår- och lymfvätska kan rinna ut i stället för att samlas under huden. Dränaget tas oftast bort efter ett dygn, men kan sitta i upp till en vecka.

Vårdform: Dagkirurgi eller inläggande.

Operationstid: 10 minuter till 1 timme.

Sjukskrivning: 2–3 veckor.

Ärr: Ibland får du ett ärr i armhålan.

Dränage: Ibland får du ett dränage.



Dränage i armhålan