

# Capecitabin

(adjuvant colorektal cancer)

Capecitabin (Xeloda)	1250 mg/m <sup>2</sup> x 2 /dag	tabletter	Dag 1-14
----------------------	---------------------------------	-----------	----------

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.  
Utvärderingsintervall: 8 kurer ges totalt.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar

**Dosreduktion** för patienter med sänkt kreaclarence <50 ml/min enl. FASS

## Dosreduktion:

Tox grad	Diarré	Capecitabin
0	Ingen diarré, och ingen ökning av avf.frekvens	100%
1	<4 avföringar per dag	100%
2	4-6 avföringar per dag, eller moderata kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 100% 2 gången: 75% 3 gången: 50%
3	7-9 avföringar per dag eller inkontinens (om pat var kontinent före beh), eller svåra kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 75% 2 gången: 50%
4	≥10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support	Avbryt Capecitabinbeh

## Dosreduktion:

Tox grad	Neutrofila (10 <sup>9</sup> /L)	Trombocyter (10 <sup>9</sup> /L)	Capecitabin
0	≥2.0	≥100	100%
1	≥1.5-<2.0	≥75-<100	100%
2	≥1.0-<1.5	≥50-<75	75%
3	≥0.5-<1.0	≥10-<50	Uppehåll tills återhämtning
4	<0.5	<10	Uppehåll tills återhämtning