

Strålbehandling och Capecitabin (GI cancer)

Capecitabin (Xeloda)	825 mg/m ² x 2 /dag	tabletter	Tabl. 7 dagar per vecka under tiden pat strålbehandlas, ca 5 veckor SB.
-----------------------------	--------------------------------	-----------	---

Inför varje vecka: Blodstatus, Neutr.

Biverkningskontroll avseende diarré, stomatit, hand-fotsyndrom, illamående-kräkning, trötthet, feber eller övriga biverkningar inför varje ny Capecitabin vecka.

Utvärderingsintervall: 4-6 veckor efter avslutad strålbehandling.

Vid illamående pröva ge S/T. Primperan 10- 20 mg 1-3 ggr/dagligen.
Om illamående efter SB -ge T. Zofran 8 mg 1 tim före SB.

Kontrollera blodstatus innan start av ny Capecitabin vecka.

Den första dagsdosen av **tabl Capecitabin tas ca 2-3 timmar (1- 4 tim) före strålbehandling, den andra ca 12 timmar (10- 14 tim) senare!!**

Dosreduktion:

Tox grad	Diarré	Capecitabin	Strålbehandling
0	Ingen diarré, och ingen ökning av avf.frekvens	100%	Fortsätt
1	<4 avföringar per dag	100%	Fortsätt
2	4-6 avföringar per dag, eller moderata kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 100% 2 gången: 75% 3 gången: 50%	Fortsätt. Administrera Loperamid
3	7-9 avföringar per dag eller inkontinens (om pat var kontinent före beh), eller svåra kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 75% 2 gången: 50%	Uppehåll tills diarrén är ≤ grad 2
4	≥10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support	Avbryt Capecitabinbeh	Avbryt tills diarrén är ≤ grad 2 (om det tar >2 veckor ska strålbeh avbrytas permanent

Tox grad	Neutrofila (10 ⁹ /L)	Trombocyter (10 ⁹ /L)	Capecitabin	Strålbehandling
0	≥2.0	≥100	100%	Fortsätt
1	≥1.5-<2.0	≥75-<100	100%	Fortsätt
2	≥1.0-<1.5	≥50-<75	75%	Fortsätt
3	≥0.5-<1.0	≥10-<50	Uppehåll tills återhämtning	Fortsätt
4	<0.5	<10	Uppehåll tills återhämtning	Uppehåll tills återhämtning