

FLOX (colorektal)

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| Oxaliplatin | 85 mg/m ² | iv inf 30-60 min | Dag 1 |
| 5-Fluorouracil | 500 mg/m ² (jämna 50-tal) | iv bolus 2-3 min | Dag 1-2 |
| Calciumfolinat | 100 mg (30-40 min efter 5FU) | iv bolus 2-5 min | Dag 1-2 |

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 14 dagar.
Utvärderingsintervall efter 4 kurer.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

Dosreduktion:

| Neutrofila (x10 ⁹ /L) | B-TPK (x10 ⁹ /L) | FLOX |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <1,3 | <100 | Avvakta till neutrofila $\geq 1.3 \times 10^9/L$ (TPK $\geq 100 \times 10^9/L$). Kan skjutas upp 2 v med oförändrad dos. Om inte värdena återhämtas v 4 skall 5-FU reduceras med 20% |

Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar:

| Biverkningar | Duration av biverkningar | | Bestående biv mellan behandlingarna |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | 1-7 dagar | > 7 dagar | |
| Dyestesier med köldkänsla | Ingen dosändring | Ingen dosändring | Ingen dosändring |
| Parestesier | Ingen dosändring | Ingen dosändring | Behandlingen avbryts |
| Parestesier med smärta | Ingen dosändring | 1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts | Behandlingen avbryts |
| Parestesier med funktionsnedsättning | Ingen dosändring | 1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts | Behandlingen avbryts |

Om man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med 5-FU/Calciumfolinat tills progress eller oacceptabla biverkningar av 5-FU.