

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

XELIRI

(GI)

Inf Irinotekan	*180 – 250 mg/m ²	Dag 1
T Capecitabin (Xeloda)	1000 mg/m ² x 2 per dag	Dag 1-14
Pat ≥65 år: Inf Irinotekan	*150 – 200 mg/m ²	Dag 1
T Capecitabin	750 mg/m ² x 2 per dag	Dag 1-14

***Startdosen** av Irinotekan är den lägre. Vid god tolerans (max grad 1tox) kan dosen höjas till den högre nivån.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar.

Dosreduktion för patienter med sänkt kreclearance <50 ml/min enl. FASS.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 3 med start dag 2 i kuren.

Förse patienten med Loperamidschema.

DAG 1

beställs till kl _____ avvakta ja nej

Ssk.sign Läk.sign

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 8 mg iv _____

Inj Atropin 0.25 mg sc _____

Inf Irinotekan _____ mg iv i 250 ml NaCl. Inf.tid 1 tim _____

Start _____

Stopp _____

DAG 1- 14

OBS! Starta alltid med kvällsdosen!

T Capecitabin _____ mg x 2 _____

motsvarar Morgondos _____ tabl á 500 mg

Kvällsdos _____ tabl á 500 mg

Delat i dosett dag 1 -14 _____

Peroral profylax

Ssk.sign Läk.sign

Antiemetikaschema nr 3. _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____