

Behandling med kortison

Behandling med kortison är vanligt vid tumörsjukdomar.

Kortison kan vara en del av behandlingen mot cancer men används också för att lindra biverkningar av behandlingen. Du kan till exempel få kortison mot illamående när du får behandling. Kortison kan också vara smärtstillande genom att minska svullnaden omkring en tumör och på så sätt minska trycket på vävnaden och nerverna intill.

Ofta ges kortisonet i tablettform eller direkt i blodet.

Biverkningar

Det är individuellt vilka biverkningar du får av behandlingen. Kortare behandlingar på några dagar upp till ett par veckor ger ofta färre och mindre allvarliga biverkningar än längre behandlingar, även om doserna är höga.

Tillsammans med din läkare väger du risken för biverkningar mot fördelarna med behandlingen.

Vanliga biverkningar

- Svullnad
- Sämre sårhäkning
- Sämre försvar mot infektioner
- Högre blodtryck
- Tunnare och rodnad hud
- Högre blodsocker
- Benskörhet
- Förtvinate muskler
- Svårt att sova

Mindre vanliga biverkningar

- Grön starr
- Grå starr
- Ökad risk för blodpropp

Vid höga doser kan du få psykiska biverkningar som depression eller mani.

När ska jag kontakta vården?

Om du får besvärliga biverkningar, kontakta din kontaktsjuksköterska eller läkare.