


Flödesschema över hur återfall av äggstockscancer behandlas

Det finns ett nationellt vårdprogram som anger hur man bäst behandlar återfall i äggstockscancer. Nedan finns en bild som visar vilka olika behandlingsalternativ som finns. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du har frågor kring din behandling.



Flödesschema över behandling av återfall av äggstockscancer.

Behandling vid återfall senare än 6 månader efter avslutad behandling

Om du får ett återfall senare än 6 månader efter avslutad behandling kommer du att rekommenderas behandling med cytotatika. I vissa fall kan operation före cytotatika-behandlingen vara aktuell. Om det inte gjorts ett gentest när du fick din diagnos, så görs det nu. Under vissa förutsättningar kan du också rekommenderas antikroppsbehandling under och efter pågående cytotatikabehandling, alternativt målinriktad behandling efter avslutad cytotatika-behandling.

Behandling vid återfall tidigare än 6 månader efter avslutad behandling

Om du får ett återfall tidigare än 6 månader efter avslutad behandling görs en individuell bedömning. Du kan rekommenderas cytotatikabehandling och eventuellt antikropps-behandling. I vissa fall rekommenderas du att avvakta behandling, till exempel om du inte har symtom, om tecknen på återfall är oklara eller om du fortfarande behöver återhämta dig från din förra behandling. Du kommer i så fall erbjudas regelbunden uppföljning.

Uppföljning

Efter avslutad behandling följs du upp enligt dina individuella behov.