

Inklusionskriterier – diagnosselektioner.
Kvalitetsregistret för OVARIALCANCER. Version 1.0, gäller från 2013-01-01

Lägeskod	ICD-10 (WHO-kod som används av inrapportörer)
	D39.1 Borderlinetumör i äggstock. C56 Malign tumör i äggstock C57.0 Malign tumör i äggledare C48.1* Peritonealcancer* C48.2* Peritonealcancer* C76.2 Malign tumör i buken C76.3 Malign tumör i bäckenet
	ICD-O/2** (WHO-kod som används av cancerregistret)
	C56.9 Borderline och malign tumör i äggstock C57.0 Malign tumör i äggledare C48.1 Peritonealcancer (exkl. f täckn.kontr. ej EF***) C48.2 Peritonealcancer (exkl. f täckn.kontr. ej EF***) C76.2 Malign tumör i buken (exkl. f täckn.kontr. ej EF) C76.3 Malign tumör i bäckenet (exkl. f täckn.kontr. ej EF***)
	För epitelial ovarialcancer inkluderas borderlinetumörer och maligna tumörer. Cancer in situ inkluderas inte. För icke epitelial ovarial-, tubar- och peritonealcancer och cancer abdominis/pelvis undantaget granulocellstumörer inkluderas enbart maligna tumörer. Granulocellstumörer inkluderas oavsett malignitetsgradering. Cancer in situ, osäkert maligna eller benigna tumörer inkluderas inte. Sekundära (metastatiska) tumörer med ovanstående lokalisationer inkluderas inte.
ICD-O/2** morfologikod	
	5:te siffran i morfologikoden enligt ICD-O/2- är 3 både för maligna tumörer i ovarium och borderlinetumörer. Borderlinetumörerna har benignitetsflagga 3. ICD-O/2 koder inom intervallet ≥80003 och <95900 med undantag för mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet ≥90500.och <90600.
Diagnosgrund	
	Endast tumörer diagnostiserade på grundval av provexcision eller operation med histopatologisk undersökning (diagnosgrund 3 i cancerregistret) eller cytologisk undersökning (diagnosgrund 5) skall registreras.
Ålder	
	≥18 år

* 48.0 = retroperitonealrummet, 48.1= med specificerad lokalisering (bäckenperitoneum, mesenterium, mesokolon, oment, peritoneumparietale), 48.2 = icke specificerad lokalisering, 48.8 = övergripande växt. Oftast används i detta sammanhang 48.2 eller 48.1

** Cancerregistret använder nu ICD-O/3 som översätts till ICD-O/2. Vi har valt att använda ICD-O/2 som urvalskriterium för att underlätta identifiering av borderlinetumörer. Lymfom i ovarium kodas under C56.9 i ICD-O/3 på annat sätt i ICD-O/2, varför vi undviker att få ut dessa.

*** ej EF = fall som identifieras i cancerregistret men ej i kvalitetsregistret efterforskas inte

Inklusionskriterier för
beräkning av
täckningsgrad i INCA för
RCC

1. Epiteliala borderlinetumörer i ovarium: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9. Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥ 80103 och < 85900 . Borderlinetumörer med 5:te siffra 3 i morfologikoden enligt ICD-O/2 och benignitetsflaggning 3.
2. Epitelial ovarialcancer: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9. Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥ 80103 och < 85900 . Maligna tumörer med 5:te siffra 3 i morfologikoden enligt ICD-O/2 och benignitetsflaggning blank.
3. Icke-epitelial ovarialcancer: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9. Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥ 85903 och < 95900 med undantag för mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet ≥ 90500 och < 90600). Maligna tumörer med siffra 3 som femte siffra i morfologikod enligt ICD-O/2 Undantag för granulocellstumörer där alla fall med morfologikoder enligt ICD-O/2 inom intervallet ≥ 86200 och ≤ 86223 inkluderas.
4. Maligna tumörer i äggledare: Lägeskod enligt ICD-O/2 C57.0. Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥ 80003 och < 95900 med undantag för mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet ≥ 90500 och < 90600 . Maligna tumörer med siffra 3 som femte siffra i morfologikod enligt ICD-O/2.
Täckningsgraderna i kategori 1-4 redovisas separat.

Exklusionskriterier

Epitelial ovarialcancer och borderlinetumörer i ovarium; Fall med 0, 1, 2, 6 eller 9 som 5:te siffra i morfologikoden enligt ICD-O/2 exkluderas. Morfologikoder enligt ICD-O/2 < 80103 och ≥ 85900 exkluderas.
Icke-epitelial ovarialcancer; Fall med med siffra 0, 1, 2, 6 eller 9 som femte siffra i morfologikoden enligt ICD-O/2- exkluderas; undantag för granulocellstumörer där fall med morfologikoder enligt ICD-O/2 inom intervallet ≥ 86200 och ≤ 86223 inkluderas även med slutsiffra 0, 1, 2 eller 3. Morfologikoder enligt ICD-O/2 < 85903 och inom intervallet ≥ 90500 och < 90600 (mesotheliom) och ≥ 95900 exkluderas.
Tumörer i äggledare; Fall med 5:e siffra 0, 1, 2, 6 eller 9 i morfologikoden enligt ICD-O/2 exkluderas. Morfologikoder enligt ICD-O/2 inom intervallet ≥ 90500 och < 90600 (mesotheliom) och ≥ 95900 exkluderas.
För alla diagnoser exkluderas fall med diagnos på grundval av enbart klinisk undersökning (diagnosgrund 1), röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT (eller motsv undersökning) (diagnosgrund 2), obduktion med eller utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 4 eller 7), operation utan histopatologisk undersökning (diagnosgrund 6) eller annan laboratorieundersökning (diagnosgrund 8).
För alla diagnoser exkluderas fall med ålder < 18 år