

Ventrikelresektion

Ventrikelresektion är en operation där en del av din magsäck tas bort.

Så går det till

Operationstekniken är olika beroende på var tumören sitter.

Vanligen tar man bort tumören och en del frisk vävnad omkring. Därefter sys magsäcken ihop.

I enstaka fall kan man behöva ta bort en större del av magsäcken och även en del av tolvfingertarmen. Därefter kopplas den magsäck som är kvar ihop med tunntarmen.

Hur mår jag efteråt?

Oftast stannar du på sjukhuset i 3–5 dagar. Du blir utskriven när allt ser bra ut och du kan äta och dricka utan större problem.

Du kan må illa, få hicka och känna dig uppblåst i övre delen av magen. Det kan betyda att du har utvecklat så kallad gastropares. Det betyder att magsäcken har sämre rörlighet och inte tömmer sitt innehåll in i tunntarmen som den ska. Då kan du behöva en slang ner i magsäcken som kallas ventrikelsond eller V-sond. Detta tillstånd går över med tiden. Under tiden är det viktigt att du försöker komma upp ur sängen med hjälp av sjukgymnast och personal. När du rör på kroppen hjälper du magsäcken att komma i gång och tömma sig.

Råd om mat och dryck

Efter operationen är din magsäck mindre. Den kan också ha sämre rörlighet under en tid. Därför är det viktigt att du äter många och små måltider.

Undvik snabba kolhydrater som godis, kakor och söta drycker. Lägg gärna till extra protein och fett till alla måltider.

Besvär du kan få om en större del av magsäcken har tagits bort

Efter en operation där en större del av magsäcken tas bort, kan du må illa, kallsvettas och känna dig matt om du äter snabbt. Det kallas dumping.

Du kan även få problem med blodsockret när du har ätit. Det kallas sen dumping. Blodsockret ökar snabbt för att sedan snabbt gå ner igen. Dessa svängningar kan orsaka alltför lågt blodsocker och göra att du svimmar. Symtom på lågt blodsocker är att du svettas, blir trött, får hjärtklappning och blir mycket sugen på något sött. Prata med din läkare eller sjuksköterska om du har återkommande besvär som kan bero på blodsockerfall.

Sjukskrivning

Efter operationen behöver du vara sjukskriven i 4–8 veckor, beroende på vad du arbetar med.