

Caelyx-Carboplatin (ovarial, corpuscancer,)

Carboplatin	AUC 5	Iv inf 30 min	Dag 1
Caelyx	30 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea, CA 125.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 28 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

Utvärderingsintervall: Datortomografi efter 3 cykler.

För att minska risken för akuta infusionsreaktioner skall kur 1 med Caelyx ges enligt följande:

Starta infusionen med hastigheten 50 ml/timme under de första 15 minuterna. Om ingen reaktion uppträder ökas infusionshastigheten sedan under påföljande 15 min till den dubbla. Om ingen reaktion uppträtt under de första 30 minuterna ges resterande mängd infusion på 1 timme. Total infusionstid blir då 1.5 timme.

Om patienten får symtom under pågående infusion som flush, anfäddhet, tryck över bröstet, ansiktsödem, blodtrycksfall, köldkänslor, huvudvärk eller ryggvärk ska infusionen avbrytas, läkare tillkallas. Ge syrgas och eventuellt Inj Tavegyl 2 mg iv under 3 min och/eller kortikosteroider. Avvakta förbättring. Fortsätt sedan infusionen med låg hastighet och öka sedan så att resterande mängd Caelyx-infusion är avslutad inom 1.5 timme.

Var observant på hjärtfunktionen om patienten tidigare fått antracykliner, eller om kumulativa dosen överskrider motsvarande 550 mg/m² doxorubicin.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Carboplatin	Caelyx
>1,3	>100	100%	100%
1,3-1,0	99-75	75%	75%
<1,0	<75	Beh uppskjutes en vecka	Beh. uppskjutes en vecka