

Cisplatin/Topotekan (Hycamtin) (Cervixcancer recidiv)

Cisplatin	50 mg/m ² /dag	iv inf 1 tim	Dag 1
Topotekan	0,75 mg/m ² /dag	iv inf 30 min	Dag 1-3

MAX kroppsyta 2,0 (modifierat efter RaH/ Linköping)

Prover inför behandling: Blodstatus, Neutr, Na, K, Krea, Mg, Leverstaus.

Inför kur 1: Audiometri om patienten har hörselnedsättning sedan tidigare.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

Cykelintervall 21 dagar.

Mellandags prover Dag 8, 15.

Utvärderingsintervall: Efter 3 cykler.

Patienten ska dricka rikligt med vätska första behandlings dygnet, minst 1L efter behandlingen.

Patienten skall informeras om att diarré är en vanlig biverkan.

Patienten skall ha Loperamid hemma att ta vid behov vid insättande av diarré och patienten ska förses med schema för intag av Loperamid.

Dosreduktion:

B-Neutrofiler (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Cisplatin	Topotekan
>1,5	>100	100%	100%
<1,5	<100	Beh. uppskjutes en vecka	Beh. uppskjutes en vecka

Om febril neutropeni eller TPK <20 x10⁹/L ska Topotekan dosreduceras med 20%