

# Temozolomid (Temodal) Maligna gliom

<b>Temozolomid</b>	150-200 mg/m <sup>2</sup> *	p o kapsel	Dag 1-5
--------------------	-----------------------------	------------	---------

\*För patient som tidigare erhållit kemoterapi är startdosen 150 mg/m<sup>2</sup>. Om denna dos tolereras väl, öka till 200 mg/m<sup>2</sup> vid kur 2.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Inför kur 1: Blodstatus, Neutro.

Under behandlingen: Blodstatus, Neutro och B-celler klassificering tas dag 22.

OBS! Överväg profylax med Eusaprim Forte 1x1, må-ons-fre, framförallt vid högdos kortison under längre tid eller lymfocyter <0,5.

Patienter som står på lägre dos än 4 mg Betapred innan behandling ska höjas till 4 mg under behandling och sedan justeras ned till tidigare dos vid kur slut.

Patienter med högre Betapreddos vid kur start ska behålla sin högre dos.

OBS! Om kräkning uppträder efter att dosen Temozolomid givits skall inte en andra dos ges den dagen.

Temozolomid sväljs hela tillsammans med lite vatten. Kapslar får ej öppnas eller tuggas.

Cykelintervall 28 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Utvärderingsintervall: Varannan månad.

## Dosreduktion för Temozolomid:

Neutrofila (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Temozolomid
≥1,5x10 <sup>9</sup> /L	≥100x10 <sup>9</sup> /L	100%
>1.0-1,5	> 75- 100	75%
<1.0	< 75	Beh uppskjutes 3-7 dagar