

Behandling av skivepitelcancer in situ

Skivepitelcancer in situ behandlas annorlunda än invasiv skivepitelcancer. Syftet med behandlingen är att hindra att förstadiet utvecklas till invasiv skivepitelcancer med risk för spridning.

Du kan rekommenderas någon eller några av följande behandlingar.

Skrapning och bränning

Liten och ytlig skivepitelcancer in situ kan ofta behandlas med ytliga ingrepp som skrapning och bränning. Du får lokalbedövning innan.

Skrapning görs med en rund kniv som skrapar av det översta hudlagret. Bränning görs med ett instrument med elström. Man varvar skrapning och bränning åtminstone 2 gånger, tills läkaren känner att det är frisk vävnad. Det kan ta upp till 4–6 veckor för såret att läka.

Frysning

Liten och ytlig skivepitelcancer in situ kan behandlas med frysning. Då används flytande kväve som har en temperatur på nästan –200 grader Celsius. Tumören och lite marginal runt om sprejas med flytande kväve. Cancercellema dör och en rodnad eller ett sår bildas. Det läker sedan från botten med friska celler. Läkningen tar 4-6 veckor.

Om det är ett lite tjockare eller kraftigt fjällande förstadium till skivepitelcancer kan man kombinera med skrapning innan frysningen. Du får lokalbedövning innan.

Laserbehandling

Liten och ytlig skivepitelcancer in situ kan på vissa kliniker behandlas med laser. Först markeras tumören med lite marginal runt om. Du får bedövning. Sedan används en koldioxidlaser som har ett speciellt ljus som bränner bort cancercellema. Efter behandlingen kan du få en rodnad, svullnad eller ett sår. Det kan ta upp till 4 veckor för såret att läka

Fotodynamisk terapi, PDT

Vid fotodynamisk terapi smörjs tumören först in med en salva som gör cancercellema ljuskänsliga. Sedan behandlas du med ett speciellt ljus i 8–10 minuter. Behandlingen upprepas igen efter några veckor.

Efter varje behandling blir hudområdet rött och sårigt. Det läker oftast efter 10–14 dagar. Behandlingen kan göra ont, men du kan få hjälp med att lindra smärtan.

Operation

Inför ingreppet blir du lokalbedövad. Förändringen skärs bort och skickas på analys. Såret går oftast att sy ihop direkt. Annars kan du behöva göra en hudtransplantation.

Du får lämna sjukhuset samma dag och såret läker inom ett par veckor. Om du har gjort en hudtransplantation kan det ta ytterligare någon vecka innan såret är läkt.