

Central venkateter, CVK


En central venkateter, CVK, är en mjuk, tunn slang som opereras in i ett blodkärl. En bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från den. En CVK kan användas under en lång period, upp till flera månader.

Förberedelser

Du får en kallelse med information om hur du ska förbereda dig för operationen.

Så går det till

Innan slangen förs in får du lokalbedövning i huden. Det kan göra att det svider i huden en stund. När huden är bedövad gör det inte ont att lägga in slangen, men du kan ändå känna att någon rör det bedövade området. Operationen tar oftast mindre än en timme.



Central venkateter.

Efteråt

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras din puls, andning och ditt blodtryck regelbundet. Bedövningen släpper efter cirka 3–4 timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Om du har ont kan du få smärtlindring.

Ditt operationssår kontrolleras också, eftersom det kan uppstå en blödning där de första timmarna efter operationen. Innan du kommer till vårdavdelningen eller går hem får du göra en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag. Efter operationen kan du äta och dricka som vanligt. De första dagarna efter operationen kan du känna ett visst obehag från CVK:n, men det brukar försvinna.

Att ha en CVK

Förbandet vid CVK:n ska bytas 1–2 gånger per vecka. Du får hjälp av en distriktssköterska eller sjuksköterska från sjukhuset.

Det är bra om du regelbundet tittar på din CVK och huden runt omkring och är observant på tecken på infektion, till exempel rodnad hud. Du kan duscha som vanligt med en CVK om den är täckt med förband, men du ska inte bada.

Varje gång sjuksköterskan kopplar på eller ifrån ett dropp eller tar ett blodprov, kommer du att få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar som den ska innan den används.

När ska jag kontakta vården?

- Om du har infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid operationsområdet.
- Om det blöder från operationssåret eller platsen för CVK:n.

► Läs mer på 1177.se. Sök på Central venkateter.