

Cancer i munhålan


Cancer i munhålan är den vanligaste cancerformen inom huvud- och halsområdet. Varje år får cirka 400 personer i Sverige munhålecancer. Det är lite vanligare bland män än kvinnor.

Olika grupper av cancer i munhålan

Munhålecancer delas in i olika grupper beroende på var tumören sitter:

- Tungcancer
- Cancer i tandköttet (gingivalcancer)
- Munbottencancer
- Cancer i kindslemhinnan (buccalcancer)
- Gomcancer

Ibland kan tumören växa i flera av dessa områden. Det vanligaste är att tumören sitter i tungan. Tumörer i munhålan kan spridas till lymfkörtlar under hakan eller på halsen.



Munhålan

Cancer i munhålan börjar vanligen i slemhinnan och är oftast av typen skivepitelcancer. Första tecknet på en tumör i munhålan är ofta ett svårläkt sår.

Tungcancer

Tungcancer bildas i den rörliga delen av tungan. Tumören syns ofta som en svullnad eller förtjockning på tungan, eller som ett sår som inte läker.

Tungcancer är den vanligaste sortens munhålecancer. Varje år diagnostiseras cirka 140 fall av tungcancer i Sverige.

Cancer i tandköttet (gingivalcancer)

Gingivan är tandköttet.

Den vanligaste formen av gingivalcancer är skivepitelcancer. Dessa tumörer kan växa yttligt, enbart i gingivan, eller växa in i det underliggande benet, kinden eller munbotten.

Varje år diagnostiseras cirka 80 fall av gingivalcancer i Sverige.

Munbottencancer

Munbotten är området under tungan.

Varje år diagnostiseras cirka 50 fall av munbottencancer i Sverige.

Cancer i kindslemhinnan (buccalcancer)

Buccan är läpparnas och kindens insida.

Varje år diagnostiseras cirka 50 fall av buccalcancer i Sverige.

2. UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Gomcancer-cancer i hårda gommen

Cancer i hårda gommen är ovanlig. Varje år diagnostiseras cirka 10 fall i Sverige.

Övrig cancer i munhålan

Om en tumör i munhålan inte stämmer med någon av beskrivningarna ovan kallas det övrig cancer i munhålan. Det vanligaste är då att tumören växer på flera ställen i munhålan, eller att man inte vet var tumören började växa.

Övrig cancer i munhålan utgör cirka 20 fall per år.

Riskfaktorer

Risken att drabbas av cancer i munhålan ökar om du röker, dricker mycket alkohol eller har dålig munhälsa. Forskning har inte kunnat visa att snus ökar risken. I många fall vet man inte varför någon drabbas.

Behandling

Munhålecancer behandlas oftast med operation. Ibland rekommenderas också strålbehandling.

För att säkert veta om canceren har spridit sig till halsens lymfkörtlar, är det vanligt att man vid operationen även tar bort lymfkörtlar för mikroskopisk undersökning. Om canceren har spridit sig strålbehandlas även lymfkörtlarna på halsen.