

## Målsökande läkemedel

Målsökande behandling kallas ibland för målriktad eller målstyrd behandling.

Syftet med behandlingen är att hämma cancercellers fortsatta tillväxt.

Målsökande behandling skiljer sig från cytostatika på så sätt att det riktar in sig på cancercellen/cancercellerna, istället för att verka mot alla celler. I gruppen målsökande läkemedel ingår även det som ibland kallas för immunoterapi.

Målsökande behandling kan ges tillsammans med cytostatika, strålbehandling eller ensamt.

### **Vid målsökande behandling är det viktigt att kontakta vården om du inte mår bra – om du får nya symtom under din behandling!**

Ibland måste man ge andra läkemedel för att få kontroll på biverkningarna och för att kunna fortsätta behandlingen. Vid vissa målsökande behandlingar kan dosen behöva justeras eller så kan man behöva göra en paus.

Kontaktsjuksköterskan kommer även att följa upp dina biverkningar. Biverkningarna försvinner när du slutar med medicinen.

## Vanliga biverkningar och råd

Beroende på vilken typ av målsökande läkemedel du får så kan biverkningarna variera. De kan till exempel vara:

- Hudbiverkningar, till exempel utslag, torr hud och klåda. Huden kan bli torr med rodnader och utslag. Handflator och fotsulor kan få förhårdnader och hudsprickor. Smörj dig dagligen med mjukgörande kräm. Eventuellt kan du behöva fotvård. Använd mjuka bekväma skor.
- Diarré. Om du får diarré, är det viktigt att du kontaktar din kontaktsjuksköterska för att få råd som gäller just dig
- Trötthet. Den kan bero på din sjukdom och på din behandling. Ta korta vilopauser under dagen. Var så aktiv som du orkar, ta gärna korta promenader. Läs mer om trötthet även kallat fatigue på [1177.se](http://1177.se)