


## Central venkateter – CVK

Om du ska få läkemedel som dropp i blodet kommer du troligen att behöva en venkateter. Genom venkatetern kan du också få blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och ibland kan även blodprover tas. Det finns olika typer av venkatetrar. Du och vårdpersonalen bestämmer tillsammans vilken venkateter du kommer att behöva.

En central venkateter, CVK, är en mjuk, tunn slang som läggs in i ett blodkärl. Det finns korttids-CVK och långtids-CVK.



## Förberedelser

Om du ska få en korttids-CVK räcker det att duscha med tvål och tvätta håret med vanligt schampo.

Om du ska få en långtids-CVK tvättar du dig med vatten och en speciell tvål, eller med ett bakteriedödande medel kvällen innan operationen. På kvällen ska du ta på dig rena kläder och bädda sängen med rena lakan. På morgonen tvättar du dig med vatten och en speciell tvål, eller med ett bakteriedödande medel, och tvättar håret med samma bakteriedödande medel. Efter sista duschen tar du på dig rena kläder.

Läkaren informerar om hur länge innan operationen du ska låta bli att äta och dricka.

Du får antibiotika före operationen för att ytterligare förebygga infektion kring venkatetern. Före operationen får du en smärtstillande tablett för att minska obehagen efteråt. Om du känner dig orolig inför operationen kan du få en avslappnande och rogivande tablett.

Om du tar blodförtunnande läkemedel behöver du tala om det för läkaren i god tid innan operation.

## Efter operationen

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Personalen på uppvakningsavdelningen kontrollerar pulsen, blodtrycket och andningen. Bedövningen släpper efter cirka tre till fyra timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Om du har ont kan du få smärtlindring.

Vårdpersonalen kontrollerar även operationssåret eftersom det kan uppstå en blödning där de första timmarna efter operationen. Innan du kommer till avdelningen eller går hem får du göra en kontrollröntgen.

Du kan oftast åka hem samma dag. Efter operationen kan du äta och dricka som vanligt. De första dagarna efter operationen kan du känna ett visst obehag från CVK:n men det brukar försvinna.

## Att ha en CVK

CVK:n ska läggas om en eller två gånger per vecka. Du får hjälp av en distriktssköterska eller personal från sjukhuset.

Det är bra om du själv kan titta på CVK:n och huden runt omkring. Du kan duscha som vanligt med en CVK om den är täckt med förband, men du ska inte bada.

Varje gång sjuksköterskan sätter eller tar bort ett dropp eller tar ett blodprov, ska du ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar som den ska innan den används.

Kontakta din läkare eller kontaktsjuksköterska om du får ett eller flera av de här besvären:

- Infektion.
- Symtom på infektion är feber, frossa eller svullnad där CVK:n sitter.
- Blödning från insticksstället.
- Svullnad i armen eller på halsen på samma sida av kroppen som CVK:n.