

Cisplatin/Etoposid "Harvardschema" (Estesioneuroblastom)

Etoposid	100 mg/m ²	iv inf 30 min	Dag 1-3
Cisplatin	33 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1-3

Inför kur 1: Krea, P Cystatin C och Audiometri. Vid hörselnedsättning/påverkan förnyad audiometri.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Kontroll av blodstatus dag 8.

Om viktökning 2 kg ge T/Inj 40 mg Furix.

Cykelintervall 14 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

Dosreduktion:

GFR ml/min	Etoposid	Cisplatin
70-79	100%	100% dag 1-4
60-69	100%	100% dag 1-3
<60	100%	Cisplatin ersätts med Carboplatin doserat enligt Calverts formel

OBS! om den nedsatta njurfunktionen beror på tumörobstruktion gives fulldos cisplatin.

Om GFR är < 80 ml/min skall cisplatin reduceras enligt schema.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Cisplatin	Etoposid
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤ 2,4-2,0	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	