

Cisplatin veckovis under strålbehandling (Huvud-hals)

Cisplatin	40 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
-----------	----------------------	--------------	-------

Inför kur 1: P-Cystatin, Krea, Audiometri.

Inför varje behandling: Blodstatus, Neutr. (Följ S-Krea inför var tredje kur.)

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring- skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin.

Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin ges med forcerad diures. Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

OBS! Ge Cisplatin infusion före strålbehandling, starta tidigast 10 timmar innan.

Under kur: Vikt x 2. Om viktuppgång >2 kg ges inj Furix 40 mg iv.

Cykelintervall: 7 dagar, under påg SB. Start v 1.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 2.

Dosreduktion

LPK (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	Cisplatin
<2,0	<75	Beh uppskjutes 3-7 dagar