

Undersökning och behandling av gallgångarna - ERCP

Om du har gulsot (ikterus) som beror på hinder i gallvägarna, behöver du oftast genomgå en första behandling mot gulsot före operationen. En sådan behandling kallas gallvägsavlastning.

ERCP är en behandlingsmetod som kan användas när gallgångarna behöver avlastas. Ett rör (en så kallad stent) sätts in i gallgången så att gallvätskan kan rinna ut i tolvfingertarmen. Röret placeras i gallgången med hjälp av ett gastroskop (ett böjligt instrument). Gastroskopet förs ned via munnen till tolvfingertarmen där öppningen till gallgångar och bukspottkörtelgång finns. ERCP används även vid cellprovtagning från gallgången.

Under undersökningen får du antingen lugnande läkemedel eller så sövs du med narkos. Undersökningen brukar ta mellan 15 och 30 minuter, men kan ibland ta upp till en och en halv timme.

Om det inte är möjligt att avlasta gallgångarna med hjälp av ERCP används istället ett så kallat PTC-dränage (en plastslang). PTC-dränaget placeras med hjälp av ultraljud genom huden, via levern och till gallgångarna och förbi hindret. Du får en kvarliggande slang på buken så länge gallgångarna behöver avlastas. Behandlingen görs i narkos på operationsavdelningen.

- ▶ Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på ERCP
- ▶ Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på PTC dränage
- ▶ Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på gallvägscancer