

# Att lämna blodprov

Blodanalyser är viktiga i din utredning och behandling.

Det är vanligt att ta blodprover inför behandlingar och för att följa upp behandlingar.

Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

## Så går det till

Du får en remiss för provtagning där det står vilka prover som ska tas och när. Remissen får du antingen på papper eller så skickas den elektroniskt direkt till provtagningsstället. Du kan ta proverna på den vårdcentral eller provtagningslaboratorium som passar dig bäst. Ofta finns drop-in tider för provtagning.

Blodprov kan tas genom ett stick i fingret, ett så kallad kapillärt blodprov, eller genom ett stick i ett blodkärl som är en ven eller en artär. Sticket kan kännas lite obehagligt.

## Viktigt att tänka på inför blodprovstagning

Ibland behöver du vara fastande inför att blodprovet ska tas. Läs på kallelsen för blodprovstagningen för information eller fråga din läkare eller sjuksköterska.

Det finns lokalbedövning, i form av kräm eller plåster som du kan köpa på apotek och som du kan använda om du tycker det är obehagligt med stick. Bedövningen verkar enbart där krämen eller plåstret sitter. Därför är det viktigt att placera bedövningen där det finns blodkärl. Sätt gärna bedövning på minst två olika ställen.

## Hur mår jag efteråt?

Vid provtagningsstället kan det bli en liten prick som försvinner efter någon dag. Ibland kan det bli ett blåmärke vid stickstället och kännas ömt. Det går oftast över efter några dagar.

## När får jag svaret?

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret och du får även veta ungefär hur lång tid det kan ta innan svaret kommer.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Att lämna blodprov.