

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Gemcitabin/Capecitabin

(Pancreas- och gallväggscancer; palliativt vid avancerad sjukdom)

T Capecitabin (Xeloda)	830 mg/m ² x 2 per dag	max engångsdos 2000 mg	Dag 1-21
Inf Gemcitabin	1000 mg/m ²	max engångsdos 2500 mg	Dag 1, 8 och 15

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea, CEA, CA19-9, EI status, Leverstatus.

Inför kommande kurer : Blodstatus, Neutr, Krea.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar.

Cykelintervall: 28 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Betapred 4 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

DAG 1 - 21

OBS! Starta alltid med kvällsdosen!

T Capecitabin _____ mg po x 2 _____

Motsvarar morgondos _____ tabl á 500 mg

Motsvarar kvällsdos _____ tabl á 500 mg

Delat i dosett dag 1 -21 _____

DAG 8 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Betapred 4 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

DAG 15 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign** **Läk.sign**

Inj Betapred 4 mg iv _____

Inf Gemcitabin _____ mg iv i 250 ml NaCl Inf tid 30 min _____

Start _____

Stopp _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____