

GEMOX (pancreascancer)

Gemcitabin	1000 mg/m ²	iv inf 100 min	Dag 1
Oxaliplatin	85 mg/m ²	iv inf 30-60 min	Dag 2

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 14 dagar.
Utvärderingsintervall efter 4 kurer.
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Gemcitabin	Oxaliplatin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
2,4-2,0	74-50	50%	50%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka	

Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar:

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biv mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts