

Pemetrexed (Alimta)/Cisplatin (mesoteliom)

Alimta	500 mg/m ²	iv inf 10-15 min	Dag 1
Cisplatin	75 mg/m ²	iv inf 2 tim	Dag 1
Behepan	1 mg	sc	Dag 1, Var 3:e kur

Inför kur 1: Audiometri, Cystatin C.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Före kur: Kortisonschema vid behandling med Alimta ges till patienten.

Premedicinering enligt cytotostatikaschema.

Under kur: Vikt x 2. Om viktökning > 2 kg ge T/ Inj Furix 40 mg iv/po.

Före behandlingsstart: Njurfunktionskontroll (P Cystatin C eller kreatininclearance eller Iohexolclearance). Om fullgod njurfunktion kan enbart kreatinin följas vid enstaka följande kurer, men om flertal kurer skall ges eller om nedsatt njurfunktion-alternativt vid signifikant kreatininstegring- skall ny njurfunktionskontroll utföras. Vid nedsatt njurfunktion individuell dosering av Cisplatin.

Kontroll av audiogram innan Cisplatinbeh. Cisplatin gives med forcerad diures.

Aminoglykosid skall ej givas under eller inom en månad efter Cisplatin-behandling. Om njurfunktionen är normal kan det sedan användas vid behov.

Förbehandling med folacin (exv. T Vitaplex Mineral 1x1) och inj Behepan 1 mg im.

Behandlingen påbörjas 7 dagar före start av Alimta-behandling. Vitaplex Mineral ges sedan dagligen under hela behandlingstiden, samt 3 veckor efter avslutad behandling. Behepan-injektion upprepas var 9:e vecka, samt tom 3 veckor efter sista behandlingen.

OBS! Om nedsatt njurfunktion, GFR<45ml/min ges ej Alimta.

NSAID och salicylpreparat skall undvikas 2 dagar före tom 2 dagar efter Alimta.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Efter kur: Antiemetikaschema 6.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Alimta	Cisplatin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	