

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

Topotekan (Hycamtin)

(SCLC)

K Topotekan (Hycamtin)*	2.3 mg/m ² /dag	Dag 1-5
-------------------------	----------------------------	---------

*Om po behandling inte kan ges kan schema för iv behandling användas.

Inför kur 1: P-Cystatin C.

För varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Om GFR <60 ml/min skall försiktighet iakttas, och eventuellt skall preparatet inte ges.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.

K Topotekan sväljs hela tillsammans med lite vatten. Kapslar får ej tuggas, krossas eller delas.

OBS! Om kräkning uppträder efter att dosen K Topotekan givits skall **inte** en andra dos ges den dagen.

Förse patienten med Loperamidschema.

Ordination dag 1-5

Ssk sign Läk sign

T Betapred 0,5 mg, 6 tabl po

T Ondansetron 8 mg po 1 tablett 30 min före K Topotekan

K Topotekan _____ mg po, motsvarar _____ st kaps á 0,25 mg

_____ st kaps á 1 mg

Delat i dosett för 5 dagar.

Godkänd av: _____ Läkarens underskrift: _____