

Carboplatin/Irinotekan (lungcancer)

Irinotekan	175 mg/m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Carboplatin	AUC 5	iv inf 30 min	Dag 1

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)
För uträkning; se övr. dokument.

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Krea och P Cystatin C.
Inför varje kur: Blodstatus, Neutr, Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 4.
Cykelintervall 21 dagar.
Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Se till att Atropin finns tillgängligt och är ordinerat vid behov (0,25 mg sc om ej kliniska kontraindikationer föreligger).

Var observant på akut kolinernt syndrom (exempelvis yrsel, svettningar, hypotoni, akut diarré), och ge då Atropin 0.25-0.50 mg sc genast.

Om patienten fått akut kolinernt syndrom tidigare ges alltid Atropin före Irinotekanbehandling.

Efter administrering:

Patienten skall informeras om att fördröjd diarré är en vanlig biverkan.

Patienten skall ha Loperamid hemma att ta vid behov vid insättande av diarré och patienten ska förse med schema för intag av Loperamid.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Irinotekan	Carboplatin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	