

Carboplatin/5FU (Esofagus) Kontinuerligt 5-FU dropp eller Pump

Carboplatin	6 AUC	iv inf 1 tim	Dag 1
5-FU	750 mg/m ² /dygn	iv inf 24 tim	Dag 1-5
G-CSF	0,6 mg/ml	Sc inj 0,5 ml	Dag 6-15

CALVERTS formel: Totaldos Carboplatin i mg = (GFR+25) x AUC (area under the curve)
För uträkning; se övr. dokument.

Inför varje kur : Blodstatus, Neutr, P Cystatin C, Krea.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 2 och 3: Samtidig strålbehandling,

Inj G-CSF 0.6 mg/ml, 0.5 ml sc dag 6-15 (>80 kg 0.96mg/ml, 0.5 ml sc).

Mellandagsprover, Blodstatus, neutr. Dag: 8, 11, 15, och 18.

Efter kur: Kontinuerligt 5 FU dropp: Antiemetikaschema nr 1.

5FU Pump: Antiemetikaschema nr 4 med start dag 2 i kuren.

Cykelintervall 21dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 cykler.

Om patient dåligt hydrerad, ge extra NaCl 1000 ml med 20 mmol KCl.

Dosreduktion:

B-LPK (x10⁹/L)	B-TPK (x10⁹/L)	Carboplatin	5FU
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
≤2,4	74-50	Beh uppskjutes 3-7 dagar	