

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata

Kur: \_\_\_\_\_ Cykel \_\_\_\_\_

Yta: \_\_\_\_\_

**ECF** (Ventrikelca)

Inf Epirubicin	50 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1, (3 cykler)
Inf Cisplatin	60 mg/m <sup>2</sup>	Dag 1, (3 cykler)
Inf 5-FU	200 mg/m <sup>2</sup> /dygn	Kontinuerlig infusion 3 veckor (3 cykler)

**Inför kur 1:** Blodstatus, Neutr, Krea, Cystatin C och Audiometri**Inför kommande kurer :** Blodstatus, Neutr, Krea.**Under kur dag 1:** Vikt x 2. Inj/T Furix 20 mg vid viktökning >1 kg.**Cykelintervall:** 21 dagar.**Efter kur:** Antiemetikaschema nr 6 med start dag 2 i kuren.**Vecka 1 dag 1** beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_

**K Emend** 125 mg po \_\_\_\_\_**Inj Ondansetron** 8 mg iv \_\_\_\_\_**Inj Betapred** 12 mg iv \_\_\_\_\_

NaCl och Epirubicin startas samtidigt!

**Inf NaCl** 1000 ml iv på 2 tim \_\_\_\_\_**Inf Epirubicin** \_\_\_\_\_ mg iv i 250 ml NaCl Inf.tid 30 min \_\_\_\_\_**Inf Cisplatin** \_\_\_\_\_ mg iv i 1000 ml NaCl Inf.tid 2 tim \_\_\_\_\_**Inf NaCl** 1000 ml iv Inf.tid 2 tim \_\_\_\_\_

Totaldos 5-FU per dygn \_\_\_\_\_ mg

**Inf 5-FU** \_\_\_\_\_ mg iv. Kontinuerlig infusionspump på 7dygn \_\_\_\_\_

kl \_\_\_\_\_ vikt \_\_\_\_\_ Inj/T Furix 20 mg vid viktökning &gt;1 kg \_\_\_\_\_

**Peroral profylax****Ssk.sign****Antiemetikaschema nr 6.** \_\_\_\_\_**Vecka 2 dag 8 datum** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Totaldos 5-FU per dygn \_\_\_\_\_ mg

**Inf 5-FU** \_\_\_\_\_ mg iv Kontinuerlig infusionspump på 7 dygn \_\_\_\_\_**Vecka 3 dag 15 datum** \_\_\_\_\_ beställs till kl \_\_\_\_\_ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Totaldos 5-FU per dygn \_\_\_\_\_ mg

**Inf 5-FU** \_\_\_\_\_ mg iv Kontinuerlig infusionspump på 7 dygn \_\_\_\_\_**Cykel 3****DAG 21 datum** \_\_\_\_\_ **Patienten kommer åter för bortkoppling av infusionspumpen** \_\_\_\_\_**Vecka 4 börjar om från början på nytt flödesschema**

Godkänt av: \_\_\_\_\_ Läkarens underskrift \_\_\_\_\_