

EOX

Epirubicin	50 mg/ m ²	iv inf 1 tim	Dag 1
Oxaliplatin	130 mg/m ²	iv inf 30-60 min	Dag 1
Capecitabin (Xeloda)	625 mg/m ² x 2 per dag	tabl p o	Dag 1-21 (sic!)

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall efter 3 kurer.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

Dosreduktion:

B-LPK (x10 ⁹ /L)	B-TPK (x10 ⁹ /L)	Oxaliplatin	Epirubicin
>3,0	>100	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%
2,4-2,0	74-50	50%	50%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka	

Tox grad	Neutrofila (10 ⁹ /L)	Trombocyter (10 ⁹ /L)	Capecitabin
0	≥2.0	≥100	100%
1	≥1.5-<2.0	≥75-<100	100%
2	≥1.0-<1.5	≥50-<75	75%
3	≥0.5-<1.0	≥10-<50	Uppehåll tills återhämtning
4	<0.5	<10	Uppehåll tills återhämtning

Dosreduktion för patienter med sänkt kreclearance<50 ml/min enl. FASS.

Dosreduktion:

Tox grad	Diarré	Capecitabin
0	Ingen diarré, och ingen ökning av avf.frekvens	100%
1	<4 avföringar per dag	100%
2	4-6 avföringar per dag, eller moderata kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 100% 2 gången: 75% 3 gången: 50%
3	7-9 avföringar per dag eller inkontinens (om pat var kontinent före beh), eller svåra kramper	Uppehåll tills gr ≤1, sen 1 gången: 75% 2 gången: 50%
4	≥10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support	Avbryt Capecitabinbeh

Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar.

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biv mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts

Om man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med Epirubicin och Capecitabin tills progress eller oacceptabla biverkningar av Capecitabin.