

Datum: _____

Patientdata

Kur: _____

Yta: _____

EOX

(GI)

Inf Oxaliplatin	130 mg/m ²	Dag 1
Inf Epirubicin	50 mg/m ²	Dag 1
T Capecitabin (Xeloda)	625 mg/m ² x 2 per dag	Dag 1-21 (sic!)

Inför varje kur: Blodstaus, Neutr.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av T Capecitabin biverkningar.

Dosreduktion för patienter med sänkt kreaclarence <50 ml/min enl. FASS.

Cykelintervall: 21 dagar.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 5.

DAG 1 beställs till kl _____ avvakta ja nej **Ssk.sign Läk.sign**

Inj Ondansetron 8 mg iv _____

Inj Betapred 12 mg iv _____

Inf Epirubicin _____ mg iv i 500 NaCl. Inf tid 1 tim _____

Start _____

Stopp _____

OBS! Endast Glucos i droppaggregatet samt spoldroppet!

Inf Oxaliplatin _____ mg iv i 500 ml Glucos 50 mg/ml. Inf.tid 30-60 min _____

Start _____

Stopp _____

T Capecitabin _____ mg po x 2

OBS! Starta alltid med kvällsdosen! _____

Motsvarar morgondos _____ tabl á 500 mg _____ tabl á 150 mg

kvällsdos _____ tabl á 500 mg _____ tabl á 150 mg

Delat i dosett dag 1 -21 _____

Peroral profylax

Ssk.sign

Antiemetikaschema nr 5. _____

Godkänt av: _____ Läkarens underskrift: _____