

## Teysuno mono (adjuvant colorektal cancer)

K Teyuno (S-1)	30 mg/m <sup>2</sup> x 2 per dag	Kapsel 15 och 20 mg	Dag 1-14
----------------	----------------------------------	---------------------	----------

Inför kur 1: Blodstatus, Neutr, Cystatin, Krea.

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.

Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 21 dagar.

Utvärderingsintervall: Efter 3 kurer.

Efter kur: Antiemetikaschema nr 1.

Kur 1-2: Pat skall kontaktas vecka 1 och 2 för kontroll av biverkningar.

**OBS:** Teyuno skall **inte** tas i samband med måltid. Senast 1 tim innan eller tidigast 1 tim efter måltid.

**Dosreduktion** för patienter med sänkt kreclearance <50 ml/min enl. FASS

### Dosreduktion vid hematologiska biverkningar

Tox grad	Neutrofila (10 <sup>9</sup> /L)	Trombocyter (10 <sup>9</sup> /L)	Teyuno
0	≥2.0	≥100	100%
1	≥1.5-<2.0	≥75-<100	100%
2	≥1.0-<1.5	≥50-<75	75%
3-4	<1.0	<50	Uppehåll tills återhämtning

### Dosreduktion vid diarré av Teyuno

Tox grad	Diarré	Teyuno
0	Ingen diarré, och ingen ökning av avf.frekvens	100%
1	<4 avföringar per dag	100%
2	4-6 avföringar per dag	Uppehåll tills grad 0-1, sedan 1 gången: Ingen dosminskning 2 gången: Dosminskning med 5 mg/m <sup>2</sup> (25 mg/m <sup>2</sup> ) 3 gången: Dosminskning med 5 mg/m <sup>2</sup> (20 mg/m <sup>2</sup> ) 4 gången: Avbryt Teyuno behandling
3	≥ 7 avföringar per dag, inkontinens (om pat var kontinent före beh), eller svåra kramper	Uppehåll tills grad 0-1, sedan 1 gången: Dosminskning med 5 mg/m <sup>2</sup> (25 mg/m <sup>2</sup> ) 2 gången: Dosminskning med 5 mg/m <sup>2</sup> (20 mg/m <sup>2</sup> ) 3 gången: Avbryt Teyuno behandling
4	≥10 avföringar per dag, eller melena eller behov av parenteral support	Uppehåll tills grad 0-1, sedan 1 gången: Dosminskning med 10 mg/m <sup>2</sup> (20 mg/m <sup>2</sup> ) 2 gången: Avbryt Teyuno behandling