

## FOLFOX (f.d.OxModdG) (colorektal)

<b>Oxaliplatin</b>	85 mg/m <sup>2</sup>		iv inf 30-60 min	Dag 1
<b>Calciumfolinat</b>	200 mg/m <sup>2</sup>	(jämna 50-tal)	iv inf 1 tim	Dag 1
<b>5-Fluorouracil</b>	400 mg/m <sup>2</sup>	(jämna 50-tal)	iv bolus 2-3 min	Dag 1
<b>5-Fluorouracil</b>	2800 mg/m <sup>2</sup> /46tim	(jämna 100-tal)	iv kontinuerlig inf	Dag 1-3

Inför varje kur: Blodstatus, Neutr.  
Premedicinering enligt cytostatikaschema.

Cykelintervall 14 dagar.  
Utvärderingsintervall efter 4 kurer.  
Efter kur: Antiemetikaschema nr 3 med start dag 2 i kuren.

Oxaliplatin ges med Glukosinf samt spoldroppet ska också vara Glucos. (OBS! Ej NaCl).

### Dosreduktion:

B-LPK (x10 <sup>9</sup> /L)	B-TPK (x10 <sup>9</sup> /L)	Oxaliplatin	5-FU	Calciumfolinat
>3,0	>100	100%	100%	100%
2,9-2,5	99-75	75%	75%	100%
2,4-2,0	74-50	50%	50%	100%
<2,0	<50	Beh uppskjutes en vecka		

### Oxaliplatin dosmodifikation för neurologiska biverkningar.

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biv mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 25% 2 gången: sänk dosen 25% 3 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1 gången: sänk dosen 50% 2 gången: Beh. avbryts	Behandlingen avbryts

**Om** man måste sätta ut Oxaliplatin pga biverkningar kan behandlingen fortsätta med 5-FU/Calciumfolinat tills progress eller oacceptabla biverkningar av 5-FU.