

5. UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR

Cell- och vävnadsprover

Leverbiopsi

Leverbiopsi görs för att utreda en förändring i din lever. Vävnadsprovet tas i lokalbedövning med en nål. För att hitta rätt ställe används en ultraljudsapparat.

Förberedelser

Du kan inte bli undersökt med leverbiopsi om du har en hög blödningsrisk. Om du använder blodförtunnande medicin kan den behöva pausas. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka läkemedel och naturläkemedel du använder. Du kommer också få lämna blodprover.

Veckan före biopsin ska du inte använda smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-hämmare om du har tillfälligt ont. Använd istället läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol om du har ont och om din läkare har sagt att det går bra. Om du använder diabetesmedicin kan du behöva ändra dosen inför undersökningen.

Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till undersökningen.

Så går det till

Du får ligga ner under provtagningen. Läkaren undersöker först din mage med ultraljud, för att veta i vilken del av levern som provet ska tas. Därefter tvättar läkaren huden och du får en spruta med bedövningsmedel i huden där provet ska tas. Själva provtagningen tar några sekunder och hela undersökningen är klar efter ungefär fem minuter.

Efteråt

Du får vara kvar på sjukhuset under dagen. Du bör ligga ner omkring fyra timmar efter leverbiopsin. De första timmarna får du oftast ligga på höger sida. Då blir det ett tryck mot levern så att den inte börjar blöda. Det finns personal som övervakar dig och kontrollerar hur du mår.

Undvik att lyfta tungt de första dagarna efter undersökningen.

När får jag svaret?

Du kommer överens med din läkare/sjuksköterska om hur du får svaret och du får även veta ungefär hur lång tid det kan ta innan svaret kommer.

När ska jag kontakta vården?

Kontakta genast mottagningen där leverbiopsin gjordes om du får ett eller flera av följande besvär:

- Du får ont i området där provet togs och det inte går över.
- Du får ont i höger skuldra.
- Du får yrsel och känner dig svimfärdig när du reser dig upp.

Sök vård på en akutmottagning om mottagningen är stängd.

► Läs mer på [1177.se](https://www.1177.se). Sök på Ultraljudsundersökning.